




CONNAÎTRE LES ESPÈCES

Truitelle ≠ jeune saumon (tacon)

Trois caractères doivent être observés en priorité :


- La bouche ① est plus petite chez le tacon : l'extrémité de la mâchoire ne dépasse pas le milieu de l'œil alors qu'elle atteint l'arrière de l'œil chez la truitelle.
- La nageoire caudale ② est très échancrée chez le tacon, peu chez la truitelle.
- La nageoire adipueuse ③, de bleuâtre à grise chez le tacon, possède une bordure rouge orangée ou brune, généralement très visible chez la truitelle.

La compétition entre ces deux salmonidés est faible. Les truitelles, plus agressives, occupent préférentiellement des secteurs à courant modéré. Les tacons, dotés de nageoires pectorales davantage développées et d'un corps plus fusiforme, colonisent des secteurs peu profonds, à forte turbulence et courant rapide (radiers).




zone de répartition

de l'ombre et du saumon



Remettons à l'eau avec délicatesse les tacons capturés.

Ombre commun ≠ chevesne



4 caractères principaux les différencient :

- La bouche ①, petite et tournée vers le bas chez l'ombre, elle est largement fendue chez le chevesne.
- La présence d'une nageoire adipueuse ② (entre la dorsale et la caudale) uniquement chez l'ombre.
- La ponctuation noire ③, sur le dos et la nageoire dorsale, uniquement chez l'ombre.
- La nageoire dorsale ④, longue et haute chez l'ombre, elle est beaucoup plus réduite chez le chevesne ; ce dernier caractère n'est utilisable qu'à partir d'une taille d'environ 15-20 cm.

L'ombre est une espèce classée "vulnérable" ; sa taille légale de capture est de 35 cm.
Remettez délicatement à l'eau tout individu n'atteignant pas cette longueur.

Rivières à saumons
Rivières à ombres